

## ALLERJİ TESTLERİ ÖNCESİNDE KULLANILMAMASI GEREKEN İLAÇLAR

ÖN BİLGİ: Allerji ilaçları (antihistaminler), öksürük şurupları, grip-soğuk algınlığı ilaçları ve bazı taşıt tutmasına karşı ilaçlar, allerji testlerinin sonuçlarının yanlış çıkmasına neden olmaktadır. Allerji testleri uygulanacak hastaların bu ilaçları belli süreler öncesinde kullanmıyor olmaları gereklidir.

Ticari adları farklı ama aynı kimyasal maddeyi içeren ilaçlara muadil (eşdeğer) adı verilir. Piyasada birçok muadil ilaç vardır. Bu nedenle aşağıdaki listelerde ilaçlar kimyasal madde adları ile sıralanmış, yanlarına da ticari adlarına örnekler verilmiştir. LİSTEDE BULUNMAYAN BİR İLAÇ KULLANIYORSANIZ, PLANLAMA AŞAMASINDA HEKİME BİLDİRİNİZ.

ÖNEMLİ NOT: Yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi hastalıklar nedeniyle sürekli kullanılan ilaçlar test planlama aşamasında hekime bildirilmeli ve bu ilaçlar KESİLMEMELİDİR.

## ALLERJİ TESTİNDEN 5 GÜN ÖNCESİNDE KESİLMESİ GEREKEN İLAÇLAR

Kimyasal madde adı Piyasa adı

Loratadine Alarin, Antor, Claritin, Clarinase, Hismen, Histadin, Loradif, Lorantis, Loraver, Loritin, Ritin

Fexofenadine Fexadyne, Fexofen, Telfast

Desloratadine Aeries

Cetirizine Allerset, Cetryn, Cirrus, Hitrizin, Ressital, Rynset, Setiral, Virlix, Yenizin, Zyrtec

Levo- Cetirizine Xyzal

Hydroxyzine Atarax, Vistaril

Diphenhydramine Allerjin, Benil, Benison, Defeks, Fenidin, Fenotral, Gayaben, Historan, Hydryllin, Koklin, Neo-jucodin, Pedilin, Tuseptil

Ketotifen Astafen, Fumast, Zaditen

Chlorpheniramine A-ferin, Apex, Babyrhinol, Benical, Broncar, Cetaflu, Coldex, Context, Corsal, Deflu, Deksa, Dorfan, Dristan, Ekorinol, Forza, Gerakon, Gribex, Katarin, Kongest, Medicold, Oledro, Theraflu, Triatus, Tukodil, Tusifon, Tylo, Vermidon Cold, Vermidon Hot, Vicks vapodry, Wintus.

Triprolidin Actifed, Actidem, Tussifed

Clemastine Tavegyl

Meclizine Postadoxine

Pheniramin Antibeksin, Avil

Cyproheptadine Prakten, Sipraktin

Pyrilamine Peditus

Dimenhydrinate Anti-em, Dramamine, Xamamine

Promethazine Artu, Sekodin

Doxylamine Unisom

#### ALLERJİ TESTİNDEN ÖNCEKİ GECE KESİLMESİ GEREKEN İLAÇLAR

Kimyasal madde adı Piyasa adı

Montelukast Singulair, Onceair, Zespira

Zafirlukast Accolate

Ranitidine Ranitab, Ranitine, Ranobel, Rozon, Santanol, Ulcuran, Zantid, Zantac, Pylorid

Famotidine Duovel, Fagastriil, Famec, Famo, Famodin, Famogast, Famoser, Famotep, Famotsan, Gasterol, Gastifam, Gastover, Gastrofam, Gastrosidin, Neotab, Nevofam, Notidin, Pepdif, Peptifarm, Ulcusar

Nizatidin Axid

#### AYRICA;

Bazı depresyon ilaçları da (trisiklik yapıda olanlar) allerji test sonuçlarını etkileyebilir. Bu tür bir ilaç kullanıyorsanız lütfen test planlama aşamasında hekime bildiriniz.